

INTEGRUM®
Extracto de Cebolla
Alantoína
Heparina Sódica

Gel Tópico
Uso Externo

Industria Argentina
Venta bajo receta

Composición

Cada 100 g de gel contiene:

Extracto de Cebolla 10 g; Alantoína 1g; Heparina Sódica 5.000 UI; Goma Xántica 2 g; Benzoato de Sodio 150 mg; Ácido Clorhídrico c.s.p. pH;
Agua destilada c.s.p. 100 g.

Presentación

Pomo x 30 g.

Acción Terapéutica

Código ATC: C05BA53

Tratamiento de las cicatrices queloides e hipertróficas y otros trastornos de la cicatrización.

Indicaciones

Cicatrices que restringen la movilidad, engrosadas (hipertróficas), abultadas (en forma de queloides) y no estéticas posteriores a procedimientos quirúrgicos, amputaciones, quemaduras y accidentes; anquilosis (contracturas) por ejemplo, de los dedos (contractura de Dupuytren) y contracturas de los tendones (traumáticas) producidas por lesiones. Retracciones de cicatrices.

Acción farmacológica

INTEGRUM® posee un efecto antiproliferativo, antiinflamatorio, suavizante y elastizante sobre el tejido cicatrizal. Reduce la inflamación y alivia el prurito asociado a la cicatrización patológica. Disminuye la coloración y el tamaño de la cicatriz patológica. Incrementa la elasticidad de las heridas induradas antiguas.

El Extracto de Cebolla posee una acción antiinflamatoria al inhibir la liberación de mediadores pro inflamatorios y una acción antialérgica. Inhibe el crecimiento de fibroblastos de variado origen, en particular de los fibroblastos que promueven la síntesis de queloides. Además, ha demostrado disminuir la formación de los constituyentes de la matriz extracelular de los fibroblastos (proteoglicanos).

Posee una acción antibacteriana. Estas propiedades contrarrestan la formación de cicatrices patológicas.

La heparina posee acciones antiinflamatorias, antialérgicas, antiproliferativas e incrementa la hidratación celular. Posee además, un efecto elastizante y suavizante sobre las estructuras colágenas. Para el tratamiento de las

cicatrices patológicas, estos efectos sobre la matriz del tejido conectivo son más importantes que su conocida acción antitrombótica.

La alantoína posee acción epitelizante, hidratante y queratolítica. Sus propiedades promueven la penetración de los demás ingredientes activos de INTEGRUM[®], incrementando su eficacia terapéutica. Estimula la renovación celular sin incrementar su multiplicación. Además, sus propiedades suavizantes y emolientes alivian el prurito asociado al proceso de cicatrización.

El efecto sinérgico logrado con los ingredientes activos de INTEGRUM[®] se basa fundamentalmente en la sinergia de sus componentes sobre la inhibición de los fibroblastos y de la proliferación patológica de la síntesis de colágeno.

Farmacocinética

No ha sido descrita hasta el momento.

Posología y Dosificación

Cicatrices recientes: si el médico no lo indica de otra manera, INTEGRUM[®] se aplica en la zona afectada mediante un masaje suave 3 o 4 veces al día hasta la total penetración del gel. En el tratamiento de cicatrices recientes, evitar todo tipo de irritaciones físicas (frío extremo, rayos UV o masajes excesivamente enérgicos).

Cicatrices antiguas: en caso de estrías cicatrizales duras y antiguas, hacer penetrar INTEGRUM[®] durante la noche por medio de un vendaje oclusivo, pudiéndose aplicar con fuerza. Según el tamaño y profundidad de la cicatriz o contractura existente, el tratamiento se prolongará durante varias semanas o meses.

Contraindicaciones

INTEGRUM[®] está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a sus principios activos y/o a los alquil-4-hidroxibenzoatos (parabenos)

Precauciones y Advertencias

Embarazo: no se ha establecido la seguridad y la eficacia de este producto en esta condición.

Pediatría: no se han descrito contraindicaciones en esta población

Durante la aplicación, sobre todo en el tratamiento de cicatrices recientes, en la zona a tratar no deberán existir irritaciones locales y deberá evitarse la exposición al frío o rayos UV y también un masaje excesivamente enérgico.

Reacciones Adversas

En general INTEGRUM[®] Gel Tópico es bien tolerado, aún en tratamientos prolongados. En muy raros casos, se ha presentado una leve irritación local cutánea.

Sobredosificación

Aún no se han informado casos en que haya habido sobredosis no tratada. En caso de sobredosificación por ingestión accidental, concurrir al hospital más cercano o a los siguientes Centros de Intoxicaciones:

Atención especializada para niños

Hospital de Niños R. Gutiérrez: (011) 4962-6666, Sánchez de Bustamante 1399 (C.A.B.A.).

Atención especializada para adultos

Hospital Posadas: (011) 4658-7777, Av. Presidente Illía y Marconi (Haedo - Bs.As.)

Hospital Fernández: (011) 4808-2655 (Unidad Toxicológica), Cerviño 3356 (C.A.B.A.).

Conservación

Conservar a temperatura ambiente, en lugar seco. No exponer a temperaturas mayores de 25 °C, protegido de la luz.

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO
Mantener fuera del alcance de los niños.**

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 51.402

Directora Técnica

Cecilia E. González, Farmacéutica

Atlas Farmacéutica S.A.

Joaquín V. González 2569

(C1417AQI) C.A.B.A.

Tel: (011) 4566-8188

Domicilio Legal: Calle 56, N° 720,
(B1900BKA) La Plata, Pcia. de Buenos Aires.

Elaborado en:

Cnel. Méndez 440

(B1875DQJ) Wilde

Prov. de Buenos Aires

Fecha de última revisión: Diciembre 2009

