

LATLAS FRESH®

Carbomer

Gel Oftálmico Estéril

Uso Externo

Industria Argentina
Venta bajo receta

Composición

Cada 100 g de gel oftálmico estéril contiene:
Carbomer 0,25 g, Mentol 0,010 g, Alcanfor 0,005 g, Cloruro de Benzalconio 0,006 g, Sorbitol 70% 4,50 g, L- Lisina Monohidrato 0,470 g, Acetato de Sodio 0,010 g, Alcohol Polivinílico 0,600 g, Agua purificada c.s.

Presentación

LATLAS FRESH® gel oftálmico estéril se presenta en frasco gotero de 10 g.

Acción Terapéutica

Sustituto de las lágrimas
Código ATC: S01XA20

Indicaciones

Tratamiento sintomático de la hiposecreción lagrimal y del ojo seco.

Características Farmacológicas

Acción Farmacológica / Mecanismo de Acción

LATLAS FRESH® es un gel oftálmico fluido a base de un polímero hidrófilo de alto peso molecular que cumple con 3 principales objetivos: mantener el metabolismo de la superficie ocular, especialmente de la córnea, suministrar una superficie lisa que permita la refracción regular de la luz y lubricar la superficie ocular para facilitar el parpadeo.

No posee actividad farmacológica sino que actúa con efecto mecánico lubricando e hidratando. Su pH y osmolaridad son similares a los de la película lagrimal normal. Su viscosidad es superior a la de una lágrima artificial lo que se traduce en una menor frecuencia de administración.

El tiempo de permanencia sobre la superficie del ojo es del orden de los 30 minutos.

La lágrima del paciente de ojo seco es hiperosmolar, esto juega un papel deletéreo en el ojo seco ya que atrae agua de las células del epitelio corneal y altera su metabolismo, disminuye su vitalidad y reduce la capa mucínica.

El mentol y el alcanfor brindan una sensación de alivio y frescura frente a los síntomas del ojo seco.

Posología y Forma de Administración

Aplicar en el fondo del saco conjuntival de cada ojo 1 gota de 1 a 4 veces por día.

Sostener el frasco entre el índice y el pulgar y acercarlo al ojo con cuidado. Inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás. Mirar hacia arriba y con el dedo índice llevar el párpado inferior hacia abajo.

Mantener el frasco perpendicular al ojo y apretarlo ligeramente para dejar caer una gota, sin tocar con el pico del frasco el ojo ni el borde del párpado.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a los componentes del producto.

Precauciones y Advertencias

- Este medicamento sólo debe utilizarse bajo supervisión médica.
- No aplicar dosis superiores o inferiores a las indicadas por el médico.
- Uso oftálmico. No inyectar. No ingerir.
- No se recomienda su uso en menores de 4 años.
- No se aconseja usar lentes de contacto en caso de tratamiento con LATLAS FRESH®.
- Si el producto se manipula incorrectamente puede llegar a contaminarse con bacterias comunes que provocan infecciones oculares. Utilizar productos oftálmicos contaminados puede provocar serios daños en el ojo. Evitar que la punta del cuentagotas entre en contacto con el ojo o con estructuras circundantes.

Embarazo y Lactancia

No se debe administrar durante el embarazo o la lactancia.

Conductores y operadores de máquinas

Luego de la instilación de LATLAS FRESH® la visión puede volverse momentáneamente borrosa hasta que el gel se extienda uniformemente en toda la superficie ocular.

Interacciones Medicamentosas

En caso de administrar en forma simultánea con otros colirios, deberán efectuarse las instilaciones con un intervalo de 15 minutos entre una y otra aplicación.

Reacciones Adversas

Posibilidad de ligero prurito en el momento de la instilación.

Eventualmente puede presentarse ligera visión borrosa después de la instilación hasta que el gel se distribuya en forma uniforme sobre la superficie del ojo.

INFORMACION PARA EL PACIENTE

¿Qué es ojo seco?

El ojo seco es la condición anormal de la superficie externa del ojo que se manifiesta cuando las personas producen pocas lágrimas o lágrimas con deficiencia en algunos de sus componentes: poca cantidad, mala calidad. Cuando uno de esos factores o ambos se presentan, pueden producirse zonas secas sobre la conjuntiva y fundamentalmente sobre la córnea que facilitan la aparición de lesiones.

¿Cómo se manifiesta el ojo seco?

El ojo seco se manifiesta a través de una variada gama de síntomas que incluyen: sensación de arenilla y/ o cuerpo extraño, ardor, quemazón,

aspereza, sensibilidad a la luz, visión de halos de colores, ojos llorosos y picazón leve.

¿Qué causa el ojo seco?

- Edad: La producción de lágrimas decrece naturalmente con los años.
- Ambiente: El clima seco, ventoso, soleado, la contaminación ambiental, los lugares cerrados, la calefacción y el aire acondicionado, los secadores de pelo y los monitores de computación pueden incrementar la evaporación lagrimal y producir ojo seco.
- Medicamentos: Ciertos medicamentos pueden disminuir la capacidad del organismo de producir lágrimas, tales como descongestivos, tranquilizantes, antidepresivos, píldoras para dormir, diuréticos, anticonceptivos, antihistamínicos, betabloqueantes, anticolinérgicos, y algunos anestésicos.
- Enfermedades sistémicas: artritis, lupus, sarcoidosis, alergias, enfermedades de piel.
- Lentes de contacto: el uso de lentes de contacto puede agravar o provocar el ojo seco.

ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO

Tener en cuenta la hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

RECORDATORIO

ESTE MEDICAMENTO HA SIDO PRESCRIPTO
PARA SU PROBLEMA MEDICO ACTUAL:
NO LO RECOMIENDE A OTRAS PERSONAS.

CUMPLIR EL CICLO COMPLETO DE TRATAMIENTO

NO SE APLIQUE MEDICAMENTOS EN PRESENCIA DE NIÑOS:
DE ESTA MANERA EVITARA QUE ELLOS TRATEN DE IMITARLO.

NO UTILIZAR DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

EVITAR QUE LA PUNTA DEL CUENTA GOTAS ENTRE EN CONTACTO
CON EL OJO O CON ESTRUCTURAS CIRCUNDANTES.

Sobredosificación

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o a los siguientes Centros de Intoxicaciones:

Atención especializada para niños

- Hospital de Niños R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
Sánchez de Bustamante 1399 (C.A.B.A.)

Atención especializada para adultos

- Hospital Posadas: (011) 4658-7777
Av. Presidente Illía y Marconi (Haedo - Pcia. de Bs. As.)
- Hospital Fernández: (011) 4801-5555

Cerviño 3356 (C.A.B.A.)

Conservación

Mantener el frasco herméticamente cerrado mientras no se utilice.
Conservar a temperatura ambiente y al abrigo de la luz.
Utilizar dentro de los 30 días de abierto el envase.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Agítese antes de usar.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 53430

Directora Técnica

Cecilia E. González, Farmacéutica.

Fecha de última revisión: Mayo 2007.

Atlas Farmacéutica S.A.

Joaquín V. González 2569
(C1417AQI) CABA
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (011) 4566-8188

